






| 内シャント造設を受けられる患者様へ | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|--|
| | | 手術日(/) | | (/) | |
| | | 術前 | | 術後 | |
| | | | | 手術後1日目 | |
| 達成目標 | 手術に対する心配事や不安な事を話することができる 手術の説明が分かる シャント音・シャントスリルが理解できる シャント造設後の注意点が理解できる | | 術後の疼痛がコントロールできる 創部の異常がない シャント音の聴取方法がわかる シャント音聴取部位がわかる | | 自己でシャント音・シャントスリルが確認できる シャント訓練が理解でき実施することができる 異常時の対応がわかる 創部の消毒方法が理解できる |
| 処置 |  | (:)手術室に行きます トイレをすませておいてください | 術後より、シャントを作った腕に、添え木(シーネ)をします | | 医師の回診があります シャントを造設した腕にあてていた添え木(シーネ)を除去します |
| 点滴 | | 手術前に、シャント手術とは、反対側の手または足に点滴を挿入します | 術後1時間経過後、著変なければ点滴を抜去します | | |
| 内服 | 内服中のお薬の確認を行います お薬手帳をお持ちのかたは一緒に出して下さい 抗生剤と血流をよくする薬を内服していただきます(入院前より内服されている方は看護師にお知らせ下さい) |  | 術後の痛みがある場合は、痛み止めの内服があります 痛みがある場合は、ナースコールでお知らせください | | 退院時に抗生剤と血流をよくするお薬を渡します 抗生剤は飲みきりで終了になります |
| 安静度 | 院内安静 | | 術後1時間は、ベッド上で安静になります 手術から1時間後、体温、脈拍、血圧を測定します。1時間後異常がなければ病棟安静になります | | 医師の回診後より院内安静 |
| 食事 | 昼食可 | | 術後1時間経過したら、夕食より可 | | |
| 清潔 | シャント造設する腕を石鹸と流水で洗っていただきます | | | | 清拭 |
| 説明 看護師 薬剤師 | 聴診器の購入手続きを外来でされていない方は、お知らせください シャントの音とはどんな音は実際に聞いてみましょう 入院時薬剤師介入:持参薬チェックを実施します  | 手術前に準備するもの ・フェイスタオル1枚 手術の前には入れ歯・指輪・時計・ピアス・ヘアピン・湿布などは外しておいてください  | 手術後実際にシャントの音やシャントスリルの確認方法を説明します 実際に確認してみましょう  | 透析室の見学があります 退院時の傷の消毒方法・入浴方法を説明します シャント訓練について説明があります注射や採血を行うときはシャントと反対側の手の甲で行うよう申し出てくださいわからない事があればいつでもスタッフにお尋ね下さい シャントの管理方法については、別紙で説明します | |